

Mejoral

Paracetamol 500mg

Comprimidos. Venta libre
Industria Argentina

¿QUÉ CONTIENE MEJORAL PARACETAMOL?
Cada comprimido contiene: Paracetamol (*) 500 mg; Excipientes, Almidón pregelatinizado (*) 38,89 mg; Povidona (*) 3,89 mg; Croscarmelosa sódica (*) 10,00 mg; Ácido esteárico (*) 2,78 mg. (*) Componentes de Paracetamol DC90.

ACCIÓN
Analgésico – antifebril.

¿PARA QUÉ SE USA ESTE MEDICAMENTO?
MEJORAL PARACETAMOL está indicado para el alivio sintomático de dolores de cabeza, menstruales, musculares leves a moderados, alivio de estados gripales y/o resfriados y reducir la fiebre.

¿CÓMO USAR ESTE MEDICAMENTO?
MEJORAL PARACETAMOL se administra por vía oral.
Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas. Dosis máxima: 4 g/día (8 comprimidos de 500 mg).
Pacientes mayores de 65 años o menores de 12 años: Consulta con su médico.
Si el dolor se mantiene durante más de 5 días, la fiebre durante más de 3 días o bien el dolor o la fiebre empeoran o aparecen otros síntomas, debe interrumpir el tratamiento y consultar a su médico.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR MEJORAL PARACETAMOL?
• Alergia conocida al paracetamol o alguno de los componentes de este medicamento.
• No debe iniciarse el tratamiento a pacientes a quienes la aspirina y otros analgésicos antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria, o reacciones alérgicas severas.
• Enfermedad del riñón, corazón o pulmones.
• Anemia (disminución de los glóbulos rojos o de la hemoglobina).

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
El paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en sobredosis.
No tomar más cantidad de medicamento que la recomendada en el apartado

"¿CÓMO USAR ESTE MEDICAMENTO?"
Si tiene antecedentes de enfermedad del tracto digestivo superior (boca, faringe, esófago y estómago), por la posibilidad de sangrado, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
Si usted consume 3 o más vasos diarios de bebida alcohólica, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
No ingiera otro medicamento que contenga paracetamol.

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

El paracetamol puede tener interacciones con los siguientes medicamentos:
-Anticoagulantes orales (utilizados para el tratamiento de enfermedades tromboembólicas).
-Antiepilépticos (utilizados para el tratamiento de las crisis epilépticas).
-Diuréticos (utilizados para aumentar la eliminación de orina).
-Isoniazida (utilizado para el tratamiento de la tuberculosis).
-Lamotrigina (utilizado para el tratamiento de la epilepsia).
-Probenecid (utilizado para el tratamiento de la gota).
-Propranolol (utilizado para el tratamiento de la hipertensión, arritmias cardíacas).
-Rifampicina (utilizado para el tratamiento de la tuberculosis).
-Colestiramina (utilizado para disminuir los niveles de colesterol en sangre).
No utilizar con otros analgésicos (medicamentos que disminuyen el dolor) sin consultar al médico.

Si le van a realizar alguna prueba analítica (incluidos análisis de sangre, orina, etc.) comunique al médico que está tomando este medicamento, ya que puede alterar los resultados de dichas pruebas.

Embarazo y lactancia
Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Importante para la mujer:
Si usted está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión y el feto, y debe ser vigilado por su médico.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?
Pueden aparecer efectos no deseados causados por este medicamento como: hinchazón y enrojecimiento de la piel, alteraciones en la sangre (disminución de plaquetas), náuseas, vómitos y malestar gástrico.Suspenda el uso de la medicación si aparecen síntomas que necesitan de una evaluación técnica.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?
Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:
Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666/2247
Hospital Dr. Alejandro Posadas - Tel. (011) 4654-6648/4658-7777
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata - Tel. (0221) 451-5555

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?
Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor: 0 800 444 72666.
O, en caso necesario, al teléfono de ANMAT RESPONDE: 0800 333 1234.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

PRESENTACIÓN: Envase conteniendo 30 comprimidos.

FORMA DE CONSERVACIÓN
Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 30°C.

Elaborado en Casella Piñero N°361, Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

Gramon Millet S. A.
Fray J. Sarmiento 2350 (B1636AKJ), Olivos, Prov. de Buenos Aires - Argentina
Directora Técnica: Julia García Buhlman - Farmacéutica
ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.
CERTIFICADO N°: 48.695

Fecha de última revisión: Agosto de 2016



3154007840
GM1217 0124
3/L74

